

UNIVERSELLES PROTOKOLL ZUR DEKOLONISIERUNG MIT SWASH[®] BATHING GLOVES ANTISEPTIC FÜR ITS-AUFNAHME

Biozide sicher verwenden




Pflegeprotokoll Bathing 21 [®] - Antiseptische Körperpflege	Thema: Universelle ITS-Dekolonisation Protokollnummer: Seite 1 von 2
Erstellt von:	Freigegeben von:

PFLEGESTANDARD: Anwendung der Swash[®] Bathing Gloves Antiseptic

VERWENDBARE HILFSMITTEL:

- Swash[®] Bathing Gloves Antiseptic Fo4070-8 (8er-Packung, nur zur Anwendung am Patienten)
- Papierhandtücher (falls erforderlich)
- Inkontinenzprodukte (falls erforderlich)
- Mikrowelle oder Wärmeschrank (falls erforderlich)
- Saubere Kleidung und/oder Bettwäsche
- Einmalhandschuhe
- Abfalleimer



PROTOKOLL:

Das folgende Pflegeprotokoll ist für ITS ausgelegt, die Swash[®] Bathing Gloves Antiseptic zur Dekolonisation implementieren.

Prüfen Sie, ob Ausschlusskriterien für Chlorhexidindigluconat, wie eine Allergie, vorliegen. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Gegenanzeigen der Swash[®] Bathing Gloves Antiseptic. Waschen Sie Patienten ab dem Tag der ITS-Aufnahme und über den gesamten ITS-Aufenthalt täglich mit Swash[®] Bathing Gloves Antiseptic. Beginnen Sie im Fall einer Wiederaufnahme des Patienten erneut mit dem Protokoll für Swash[®] Bathing Gloves Antiseptic. Beenden Sie das Protokoll nach der Entlassung oder Verlegung von der ITS.

WIRKSTOFF: CHLORHEXIDINDIGLUCONAT

Das Waschen mit Chlorhexidindigluconat (CHG) reduziert die Bakterienlast auf der Haut der Patienten, senkt die Übertragung therapieassoziiierter Infektionen (HCAI) und minimiert HCAIs. Die Körperwäsche mit Chlorhexidin wurde mit niedrigeren Infektionsraten und einer niedrigeren MRSA-, VRE- und ESBL-Bakterienlast auf Hautoberflächen assoziiert und kann zudem Kreuzkontaminationen reduzieren. So wird das Risiko einer horizontalen Übertragung zwischen medizinischem Personal und Patienten reduziert.

ABLAUF:

Die Swash[®] Bathing Antiseptic können im Haushaltsraum oder neben dem Bett des Patienten aufbewahrt werden. Sie können sowohl erwärmt als auch bei Raumtemperatur verwendet werden. Swash[®] Bathing Gloves Antiseptic ersetzen das Waschen mit Wasser und Seife. Sie sollten nicht zusätzlich nach dem Waschen verwendet werden. Es geht vielmehr um den Reinigungsprozess zur Entfernung von Bakterien und die Bindung der Lotion an die Haut für eine anhaltende antibakterielle Wirkung über 6 Stunden. Daher können Swash[®] Bathing Gloves Antiseptic zu allen Waschzwecken, wie zur täglichen Ganzkörperwäsche, bei Inkontinenz oder zusätzlichen Reinigung aus anderen Gründen, verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt so oft wie nötig während des Tages. Nicht in den Genitalien, in den Augen, in den Gehörgängen, im Mund und auf den Schleimhäuten anwenden.

Unten wird der Ablauf beim Waschen mit diesem antiseptischen Produkt beschrieben. Je nach Mobilität des Patienten kann auch die Reihenfolge geändert werden, vorausgesetzt, dass jeder Teil des Körpers (siehe Abbildung) mit einem separaten Waschhandschuh gewaschen wird.

- 1 Ein Wandposter kann als Ausdruck in Patientenzimmern aufgehängt werden. Auf dem Poster wird der Ablauf des Waschens mit den Swash[®] Bathing Gloves Antiseptic dargestellt.
 - 2 Swash[®] Bathing Gloves Antiseptic entfernen beim Waschen Bakterien von der Haut. Die Haut sollte gründlich gewaschen werden.
 - 3 Waschen Sie vor Beginn Ihre Hände und tragen Sie aus hygienischen Gründen Einmalhandschuhe.
 - 4 Waschen Sie vor der Verwendung der Swash[®] Bathing Gloves Antiseptic Gesicht und Haare wie gewohnt. Verwenden Sie außer Shampoo keine Spülung oder andere Haarpflegeprodukte. Alternativ können Sie die Swash[®] Antiseptic Cap zur Dekolonisierung der Haare nutzen.
 - 5 Sie können die Handschuhe in einer Mikrowelle oder in einem Wärmeschrank erwärmen. Die Temperatur wird durch Erwärmen der Verpackung in einer Mikrowelle bei maximal 800 Watt für 15 Sekunden oder in einem Wärmeschrank durch die Haltung der Temperatur von 51 °C (für max. 96 Std.) erreicht. Die Erwärmung dient dem Komfort des Patienten und ist nicht zwingend erforderlich. Kalte Handschuhe sind benutzbar und können verwendet werden, wenn der Patient einen kalten Handschuh wünscht.
 - 6 Öffnen Sie die Packung, indem Sie den Verschluss aufziehen und die Temperatur der Waschhandschuhe überprüfen. Hinweis: Einmalhandschuhe verringern Ihre Hitzeempfindlichkeit.
 - 7 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Swash[®] Bathing Gloves Antiseptic oberhalb der Kinnpartie nutzen². Chlorhexidin sollte nicht in die Augen, die Gehörgänge, den Mund oder die Schleimhäute gelangen.
 - 8 Waschen Sie alle Körperbereiche mit den Handschuhen vorsichtig in einer Vor- und Rückbewegung. NICHT scheuern. Verwenden Sie die acht Handschuhe zum Waschen aller Körperbereiche. Berücksichtigen Sie während des gesamten Waschvorgangs das Wohlbefinden des Patienten.
- Waschhandschuh 1: Bevor Sie beginnen, legen Sie den Waschhandschuh auf das Handgelenk oder den Handrücken des Patienten. Fragen Sie ihn oder sie, ob die Temperatur für ihn oder sie angenehm ist. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie warten, bis der Waschhandschuh eine für den Patienten angenehme Temperatur erreicht hat. Dann waschen Sie das Gesicht (seien Sie vorsichtig und waschen Sie nicht in den Augen, den Gehörgängen, dem Mund oder den Schleimhäuten), den Hals und die Brust des Patienten. Verwenden Sie dabei die beiden Seiten des Waschhandschuhs. Achten Sie während des gesamten Waschvorgangs auf das Wohlbefinden des Patienten. Nach dem Waschen werfen Sie den Waschhandschuh weg.



- Waschhandschuh 2: Rechter Arm, Schulter, Hand, Interdigitalräume und Achsel. Waschen Sie mit beiden Seiten des Waschhandschuhs den Arm, der sich an Ihrer Seite befindet. Beginnen Sie am Handgelenk und waschen Sie die Armoberseite mit kreisenden Bewegungen bis zur Achselhöhle. Kehren Sie den Waschhandschuh um, waschen Sie die Armunterseite und beenden dies bei der Hand. Achtung: Verwenden Sie beide Seiten des Waschhandschuhs. Da sich die Waschlotion verflüchtigt, ist Abtrocknen nicht mehr notwendig. Nach dem Waschen werfen Sie den Waschhandschuh weg.
 - Waschhandschuh 3: Linker Arm, Schulter, Hand, Interdigitalräume und Achsel. Gehen Sie zur anderen Seite des Bettes und waschen Sie die Hand, den Arm und die Achselhöhle die sich jetzt an Ihrer Seite befinden und wiederholen Sie den vorherigen Schritt. Nach dem Waschen werfen Sie den Waschhandschuh weg.
 - Waschhandschuh 4: Waschen Sie den Bauch und dann die Leiste/Perineum. Falls zutreffend, entfernen Sie vorhandenes Inkontinenzmaterial und waschen den Perineum-Bereich mit beiden Seiten des Waschhandschuhs. Nicht in den Genitalien waschen. Verwenden Sie hierfür ein nasses Tuch oder Zellstofftuch. Nach dem Waschen werfen Sie den Waschhandschuh weg.
 - Waschhandschuh 5: Rechtes Bein, Fuß und Interdigitalräume. Waschen Sie mit beiden Seiten des Waschhandschuhs das Bein und den Fuß, die sich an Ihrer Seite befinden. Beginnen Sie am Fußgelenk und waschen Sie mit kreisenden Bewegungen die Beinoberseite bis zur Leiste. Kehren Sie den Waschhandschuh um, waschen Sie die Beinunterseite von oben bis zum Fuß. Nach dem Waschen werfen Sie den Waschhandschuh weg.
 - Waschhandschuh 6: Linkes Bein, Fuß und Interdigitalräume. Gehen Sie zur anderen Seite des Bettes und waschen Sie mit beiden Seiten des Waschhandschuhs das Bein und den Fuß, die sich jetzt an Ihrer Seite befinden und wiederholen Sie den vorherigen Schritt. Nach dem Waschen werfen Sie den Waschhandschuh weg.
 - Waschhandschuh 7: Nacken und Rücken. Bitten Sie den Patienten, sich auf die Seite zu drehen und bieten Sie nötigenfalls Hilfe an. Waschen Sie mit beiden Seiten des Waschhandschuhs den Rücken des Patienten. Nach dem Waschen werfen Sie den Waschhandschuh weg.
 - Waschhandschuh 8: Gesäß. Waschen Sie mit beiden Seiten des Waschhandschuhs das Gesäß und das Steißbein des Patienten. Falls zusätzlicher Pflegebedarf besteht, müssen Sie die passenden Inkontinenzprodukte verwenden. Kleiden Sie den Patienten wieder an und legen ihn in die gewünschte Position. Nach dem Waschen werfen Sie den Waschhandschuh weg.
- 9 Nutzen Sie, sofern erforderlich, zusätzliche antiseptische Waschhandschuhe, um den Körper sorgfältig zu reinigen.
- 10 Nicht mit Wasser abspülen oder abwischen. An der Luft trocknen lassen. Die Haut trocknet durch die Verdunstung der Lotion von alleine. Falls erforderlich, trocknen Sie Hautfalten durch Abtupfen mit Papierhandtüchern.
- 11 Swash® Bathing Gloves Antiseptic sind feuchtigkeitsspendend. Ist eine zusätzliche feuchtigkeitsspendende Creme oder eine Lotion erforderlich, tragen Sie nur Lotionen auf, die bekanntermaßen mit Chlorhexidindigluconat verträglich sind. Die CHG-Verträglichkeit ist vom Hersteller oder dem Anwender der Lotion zu prüfen.
- 12 Entsorgen Sie die leere Swash®-Verpackung und die Waschhandschuhe im Abfalleimer. Achtung: Die Waschhandschuhe dürfen niemals über die Toilette entsorgt werden. Notieren Sie eventuelle Anmerkungen.

ACHTUNG!

- NICHT scheuern und NUR zur äußeren Anwendung. Seien Sie VORSICHTIG bei der Anwendung oberhalb der Kinnpartie. NICHT abspülen und KEINE Lotionen auftragen.
- Reinigen Sie nach der Anwendung auf jeder Körperseite die Katheter, Drainagen, G-Schlauch/J-Schläuche, Rektaltuben, Thorax-drainagen innerhalb eines Radius von 15 cm um den Patienten.
- Sorgen Sie für eine gründliche Reinigung unter besonderer Beachtung häufig verunreinigter Stellen, wie Hals, Hautfalten und Perinealbereich. Chlorhexidindigluconat kann, außer auf äußerer Schleimhaut, im Perinealbereich sicher verwendet werden.
- Achten Sie besonders auf die Reinigung von Zugängen, die die Hautbereiche umgeben, und andere Geräte, um die Entfernung der Bakterien von der Haut sicherzustellen. Chlorhexidindigluconat kann sicher auf Geräten und über semiokklusiven Wundverbänden verwendet werden.
- Spülen Sie im Fall einer Inkontinenz den betroffenen Bereich unter Verwendung eines Tuches ab. Reinigen Sie dann die Haut mit den Swash® Bathing Gloves Antiseptic. Verwenden Sie CHG-verträgliche Barriereprodukte, sofern dies erforderlich ist.
- Die Haut kann sich nach der Anwendung einige Minuten lang feucht anfühlen.
- Legen Sie die Swash® Bathing Gloves Antiseptic nicht direkt auf die Bettwäsche, da der Kontakt mit Bleiche braune Flecken verursachen kann.
- Dieses Produkt sollte nicht in die Augen, in die Gehörgänge, in den Mund oder auf die Schleimhäute gelangen.
- Waschen Sie bei Juckreiz oder Brennen oder im Fall eines auftretenden Hautausschlages die Stelle mit Wasser. Stellen Sie die Verwendung ein. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Spezialisten/Hautarzt.
- Achten Sie stets auf die Bedürfnisse und Empfindungen des Patienten.
- Jede Packung darf nur für eine Person verwendet werden. Aufgrund der Infektionsgefahr wird davon abgeraten, geöffnete Packungen aufzuheben oder wiederzuverwenden.
- Befolgen Sie die richtige Vorgehensweise für das Waschen des Körpers. Verwenden Sie für jedes Körperteil einen neuen Waschhandschuh. Dadurch senken Sie das Risiko von Kreuzkontaminationen.
- Entsorgen Sie die Waschhandschuhe nicht in der Toilette.
- Verwenden Sie eine geöffnete Packung NICHT nach 48 Stunden. Sind Handschuhe in der Packung übrig, schreiben Sie bitte Datum und Uhrzeit auf die Packung und verwenden Sie diese innerhalb von 48 Stunden für den selben Patienten.
- Wenn die Swash® Bathing Gloves Antiseptic gemäß den Gebrauchsanweisungen erwärmt werden, muss die Temperatur der Handschuhe vor Anwendung auf der Haut geprüft werden. Sind die Swash® Bathing Handschuhe heiß, dürfen sie nicht sofort verwendet werden. Denken Sie daran, dass das Tragen von Einmalhandschuhen die Wärmewahrnehmung reduziert. Prüfen Sie die Temperatur insbesondere bei Kleinkindern oder Personen, die nicht reagieren können oder eine empfindliche Haut haben.
- Verwenden Sie außer Shampoo keine Spülung oder andere Haarpflegeprodukte.

IN DIESEN FÄLLEN SOLLTEN SIE SWASH® BATHING GLOVES ANTISEPTIC NICHT VERWENDEN (GEGENANZEIGEN):

- Offene Wunden, wie Dekubitus oder Verbrennungen.
- Schwer geschädigte oder gereizte Haut.
- In den Augen, Gehörgängen und auf den Schleimhäuten.
- Im Fall einer Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidin oder einen der Inhaltsstoffe von Swash®.
- Treten nach der ersten Anwendung starker Juckreiz und Rötungen auf, spülen Sie den Bereich ab und stellen Sie die Verwendung der restlichen Handschuhe ein.
- Vermeiden Sie während der Stillzeit die Anwendung an Brust/Brustwarze.
- Nicht geeignet für Frühchen und Säuglinge unter 3 Monaten.
- Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker im Fall einer Anwendung mit medizinischen Salben/Lotionen.

Die Informationen in diesem Protokoll beziehen sich speziell auf die Verwendung der Swash® Bathing Gloves Antiseptic für das Waschen und die Pflege von bettlägerigen Patienten. Zusätzliche Interventionen und Schritte können dem Protokoll gemäß anderer Protokolle und Richtlinien in Ihrer Pflegeeinrichtung hinzugefügt werden.

^a Chlorhexidin wurde in mehreren Studien sicher auf Gesicht und Haaren angewendet, dabei wurde mit besonderer Sorgfalt der Kontakt mit Augen und Ohrkanälen vermieden. Es besteht ein Risiko, wenn Chlorhexidin in direkten Kontakt mit Nerven kommt, wie dies bei einem perforierten Trommelfell oder direktem Augenkontakt der Fall sein kann. In der Studie REDUCE MRSA wird der Hautkontakt oberhalb der Kinnpartie vermieden, sodass kein Kontakt von Chlorhexidin mit diesen Bereichen zustande kommt.